


保護者の皆様へ

## いつも笑顔で明るく元気でいて欲しい 子どもにワクチン必要ですか？



お父さん、お母さん  
我が子を治験という  
実験に差し出しますか？

ワクチン接種は予防の一つかもしれません。でも、仕事・育児・  
家事にと奮闘する中で、他に知るべき情報を見逃しているかも？

お子さまへの接種の前に、今一度見直してみませんか？

- ワクチン接種をした子ども達に、重い副反応や後遺症、死亡例が出ていることを知っていますか？
- 新型コロナのワクチンは「特例承認」「治験中」、接種は「任意」であることを知っていますか？
- ワクチン開発期間がたったの1年未満、人類初のmRNAワクチンということを知っていますか？
- 厚労省HPにある安全性についての項目や、ファイザーの添付文書を確認しましたか？
- ワクチンの成分を確認しましたか？

体がしびれるの?  
胸が痛くなるの?  
ちょっとこわいな

自然免疫があるのに本当に打たなきゃダメ？

これらはテレビ等では扱われません。見つけにくい厚労省の詳細もSNS等で紹介されています。ワクチン接種前に改めて調べ、どうか慎重にご判断下さればと願います。





## 「周囲のために接種しなければ」と思い込んでいませんか?

厚労省の発表では新型コロナを他人にうつすケースは2割以下です。一方で、効果が期待された新型コロナワクチン2回接種者の感染率は75.9%と高く、ワクチンの効果が低いことが解ってきました。

### ● 10代以下の新型コロナワクチン接種後の状況(2022年1月現在)

	副反応報告	重篤者数	死者数
ファイザー	1026件	265件	4件
モデルナ	499件	341件	1件
合計	1525件	606件	5件

12才の副反応データでは85人中31人(36%)が、「重篤度:重い」と分類されています。

※「コロナワクチン副反応データベース検索(厚生科学審議会PDFに基づく)」HPより

● ワクチン開発は最短でも5年かかるとされる中、新型コロナワクチンは1年未満で開発され、現在も臨床試験中です。また新種のワクチンであるため、これまでに明らかになっていない症状の出る可能性や、様々な副反応・後遺症があることも厚労省のHPに表記されています。

※一般的に「ワクチン」は副反応が強ければ劇薬、とても強ければ毒薬とされています。

● ファイザー添付の「コミニティ筋注」には「劇薬」の表記。2021年11月に改訂され、2回接種は12歳以上、3回目は18歳以上と対象年齢が引き下げられました。ですが国は5~11歳の子どもに推奨・承認。副反応は下記表の通りですが、特例承認なので製薬会社は責任を問われず、また、国の救済制度(予防接種健康被害救済制度)も未だ1件も適用されていません。何があっても自己責任、治療費も自己負担となります。

mrNAワクチン 接種後の 副反応・後遺症	死亡、心筋炎、心膜炎、脳炎、脳症、肝機能障害、意識障害、呼吸不全、血尿、歩行・起立障害、痙攣、アナフィラキシー、失神、多形紅斑、尋麻疹、等々
-----------------------------	--

●【ワクチン成分(添加剤)】ALC-0315／ALC-0159／DSPC／コレステロール／精製白糖／塩化ナトリウム／塩化カリウム／リン酸水素ナトリウム二水和物／リン酸二水素カリウム

大和覚醒Project◆こどもたちへのワクチンを止めよう▶

ハガキサイズ

