

「周囲のために接種しなければ」と思い込んでいませんか？

厚労省の発表では新型コロナを他人にうつすケースは2割以下です。一方で、効果が期待された新型コロナワクチン2回接種者の感染率は75.9%と高く、ワクチンの効果が低いことが解ってきました。

● 10代以下の新型コロナワクチン接種後の状況(2022年1月現在)

	副反応報告	重篤者数	死亡者数
ファイザー	1026件	265件	4件
モデルナ	499件	341件	1件
合計	1525件	606件	5件

12才の副反応データでは85人中31人(36%)が、「重篤度:重し」と分類されています。

※「コロナワクチン副反応データベース検索(厚生科学審議会PDFに基づく)」HPより

- ワクチン開発は最短でも5年かかるとされる中、新型コロナワクチンは1年未滿で開発され、現在も臨床試験中です。また新種のワクチンであるため、これまでに明らかになっていない症状の出る可能性や、様々な副反応*・後遺症があることも厚労省のHPに表記されています。

※一般的に「ワクチン」は副反応が弱ければ劇薬、とても強ければ毒薬とされています。

- ファイザー添付の「**コミュニティ筋注**」には「**劇薬**」の表記。2021年11月に改訂され、2回接種は12歳以上、3回目は18歳以上と対象年齢が引き下げられました。ですが国は5~11歳の子どもにも推奨・承認。副反応は下記表の通りですが、特例承認なので製薬会社は責任を問われず、また、国の救済制度(予防接種健康被害救済制度)も未だ1件も適用されていません。何があっても**自己責任**、**治療費も自己負担**となります。

mRNAワクチン 接種後の 副反応・後遺症	死亡、心筋炎、心膜炎、脳炎、脳症、肝機能障害、意識障害、呼吸不全、血尿、歩行・起立障害、痙攣、アナフィラキシー、失神、多形紅斑、蕁麻疹、等々
-----------------------------	--

- 【ワクチン成分(添加剤)】 ALC-0315/ALC-0159/DSPC /コレステロール/精製白糖/塩化ナトリウム/塩化カリウム/リン酸水素ナトリウム二水和物/リン酸二水素カリウム

大和覚醒Project ◆ こどもたちへのワクチンを止めよう ▶

ハガキサイズ

